

INTERVENTION FRELONS ASIATIQUES

Le frelon asiatique a été observé pour la première fois en France en **2004** dans le Lot et Garonne.

Depuis, l'espèce s'est **acclimatée** en France .
Début décembre 2015, un nid a été identifié sur la commune de Granges-sur-Aube dans la Marne.



RAPPEL HYMENOPTERES



L'abeille mesure entre 1,1 et 1,3 cm.

Elle est:

- plus brune que la guêpe
- Plus compacte et plus poilue



La guêpe mesure entre 1 et 3 cm.

Elle est:

- Jaune vif rayé de noir
- L'abdomen et le corps sont distincts




Le bourdon mesure entre 1 et 1,5 cm .

- il est plus gros et plus velue que l'abeille
- il fait un bourdonnement caractéristique



Le frelon européen mesure entre 2,5 et 4 cm .

- il est brun-rougeâtre
- il a des bandes jaunes



Le frelon asiatique mesure entre 2,5 et 3 cm. Il est reconnaissable à :

- son thorax noir,
- ses ailes sombres,
- son abdomen sombre cerné d'un anneau jaune,
- ses pattes jaunes.

NID DE FRELONS ASIATIQUES



Comme, le Frelon d'Europe, le **frelon asiatique** construit un volumineux nid
On le trouve:

- **Le plus souvent** au sommet des arbres (parfois à plus de 30m),
- Occasionnellement dans les buissons, sous les toits...

Il peut être :

- de formes sphériques,
- en forme de goutte d'eau.

L'orifice de sortie est petit et latéral alors qu'il est large et basal chez le Frelon d'Europe.

RISQUES

De nature non agressive vis-à-vis de l'homme, le frelon asiatique peut se montrer très agressif dans un périmètre de 5 à 10 mètres autour du nid:

- **Attaque en groupe**
- **Aiguillon capable de traverser des tissus épais**
- **Pulvérisation de venin à distance**



CONDUITE A TENIR

1. Faire une reconnaissance (type d'hyménoptères, nid accessible ou non, ...).



La destruction des essaims d'abeilles n'est effectuée que s'il y a un danger immédiat. En l'absence de danger immédiat, il faut demander au CTA-CODIS la présence d'un apiculteur.

2. Eloigner les personnes non équipées.

3. S'équiper des EPI adaptés toujours en binôme.

- Tenue F1 manches baissées
- Combinaison de protection
- Masque FFP2
- Protection oculaire



4. Vérifier mutuellement l'étanchéité des combinaisons.

5. **Si le nid est accessible:**

- pulvériser l'insecticide liquide par l'entrée du nid et sur les parois externes;
- Après action de l'insecticide, retirer le nid, le placer dans un sac fermé et le jeter dans une poubelle.

6. **Si le nid est inaccessible:**

- pulvériser l'insecticide poudre à l'endroit où pénètrent les insectes et autour afin que les insectes transportent le produit avec leurs ailes et leurs pattes à l'intérieur du nid.

7. Respecter les règles d'hygiène courantes (lavage des mains, ...).

8. Nettoyage adapté du matériel et rangement au CS.

Mise en place du LSPCC pour sécurisation du personnel si besoin.



EN CAS DE PIQUES

En cas de piqûres multiples ou de réaction anormale:

- sensation de malaise,
- Éruption prurigineuse sur l'ensemble du corps,
- Difficultés respiratoires...



Informez immédiatement le CTA-CODIS qui engage un VSAV en prompt secours. Le CTA transfère l'appel du sapeur-pompier au SAMU pour régulation médicale.